



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus:RSV)

เป็นโรคที่มักพบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งในเด็กเล็กแรกเกิด ถึง 5 ปี อาจมีอาการรุนแรงได้มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ การดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี(RSV) ยังมีความสำคัญมาก

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ขอความร่วมมือผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด พาไปพบแพทย์รับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป

การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค แต่สามารถปฏิบัติตามวิธีเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้แก้วน้ำหรือของใช้ร่วมกับผู้อื่น รักษาสุขอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อและการไปในสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่น ควรสวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารที่ถูกต้องสุขลักษณะ ดื่มน้ำมากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ



การติดต่อ



โรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี พบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี รวมทั้งผู้ที่โรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ

เชื้อไวรัส RSV พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน - ฤดูหนาว

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาเชื้อไวรัส RSV อย่างเป็นทางการ



ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก
ยาแก้ไอและยาอื่นๆ

อาการ

หลังติดเชื้อประมาณ 4 - 6 วัน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการดังนี้



ไข้



ไอ เจ็บคอ



มีน้ำมูก

อาการรุนแรง : หายใจเร็ว หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด เมื่อหายใจ หรือเมื่อหลับ
หมายเหตุ : หากมีอาการรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันที

การป้องกัน



หมั่นล้างมือ
ด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ



ทำความสะอาดของใช้ ของเล่น
และสิ่งที่มีสัมผัสบ่อยๆ



หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย
และการไปสถานที่แออัด



รักษาสุขอนามัย
และไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน

ด้วยความปรารถนาดี จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

DGC กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

1422